




## ❖ Hauts-jets avec cépées d'arbustes

### ❖ Description générale :

Ces haies sont structurées en plusieurs strates : une strate herbacée, buissonnante/arbustive et arborée. Les essences d'arbustes, en cépées, peuvent être diversifiées et habiller la haie jusqu'aux 5-6 premiers mètres de hauteur. Les essences d'arbres sont quant à elles uniquement présentes sous la forme de haut-jets et structurent la strate arbustive et arborée.

Dans le Jura, différentes formes de haut-jets avec cépées d'arbustes peuvent être observées. Ces haies se distinguent principalement de par le niveau de couverture de la strate arbustive et de par la richesse de la strate arborée.

- Dans le Haut-Jura, sur les plateaux, ainsi qu'en Combe d'Ain, le noisetier est l'essence principale qui couvre la strate arbustive du taillis sous futaie. Dans les autres petites régions agricoles (PRA), la strate arbustive se compose de noisetier et d'autres arbustes qui gagnent en hauteur comme le prunelier et l'aubépine.
- Dans certaines haies du Haut-Jura, du Premier et du Second plateau, le frêne est la seule essence d'arbres de haut-jet.



### ❖ Contexte général :

Ces taillis sous futaie peuvent être observés dans différents contextes agricoles. Les haies sont généralement en bordure de parcelles (interparcellaire ou en bordure de route/chemin).

Certains linéaires se retrouvent également en milieu de prairies, mais leur longueur est moindre. En Petite Montagne, des taillis sous futaie intraparcellaires sont présents sous forme de petits îlots sur murger, en prairie, et sur sol superficiel.

En prairies pâturées, ces types de haies apportent de l'ombrage, du fourrage, et peuvent servir en tant que délimitation de paddocks.

## ❖ Préconisations de gestion :

### Maintien

- Ce type de haie nécessite un entretien tous les 10 ans.
- Cet entretien consiste à éclaircir certains tronçons de la haie pour relancer le dynamisme de la strate arbustive, buissonnante et herbacée.

### Modalités de gestion :

Renouvellement du taillis d'arbustes :

- ➔ Recépage tous les 10-15 ans (**fiche 2**)

Gestion de la futaie (**fiche 4**) :

- ➔ Prélèvements tous les 15-20 ans d'arbres mûres
- ➔ Elagage régulier des branches latérales basses.

### Diversification

- La structure de ce type de haie peut être diversifiée pour des raisons paysagères et/ou pour des objectifs de valorisation.
- Evolution vers le type "Hauts-jets avec cépées d'arbres et d'arbustes"

### Modalités de gestion :

Production de bois de chauffage / bois plaquette :

- ➔ Etêtage (**fiche 5**)
- ➔ Recépage d'arbres (**fiche 2**)

➔ Recépage d'arbres (**fiche 2**)



Haut-Jura



Second Plateau



Combe d'Ain



Plaines & Vallées du Doubs,...



Revermont



Bresse