



❖ Cépées d'arbustes


2. Cépées d'arbustes buissonnants

❖ Description :

Ce type de taillis simple est formé par des jeunes cépées de 2-4m de hauteur, d'aspect buissonnant et dense. La diversité d'essences d'arbustes est variable. Certaines haies ne sont composées que de 2-3 essences dominantes, des essences dites pionnières (ex : prunelier, aubépine, cornouiller sanguin).

❖ Contexte :

Ce type de haie est particulièrement commun dans le Revermont, en bordure de prairie. Mais on en retrouve, de manière générale, dans les autres petites régions agricoles. Il s'agit de haies en évolution qui se sont spontanément développées au pied et autour des clôtures délimitant les prairies. Leur développement semble plus libre en relief qu'en plaine.



Ce type de taillis a une forte valeur écologique pour certaines espèces emblématiques telles que la **pie grièche écorcheur** et la **pie grièche grise**. Ces deux espèces ont une préférence vis-à-vis de certaines structures du milieu bocager : le milieu le plus favorable à ces deux espèces se compose d'une part importante de haies buissonnantes basses ou moyennes, connectées entre elles. En effet, les passereaux sont connus pour apprécier, comme site de nidification, les haies arbustives plutôt épineuses : le nid se retrouve protégé. Les pies grièches ont en plus la particularité d'empaler les insectes chassés dans les épines qui servent de garde-manger.

Pour en savoir + : Une étude a été réalisée par Léa Chalvin pour définir les caractéristiques bocagères favorables à la présence de la pie grièche écorcheur dans la région Petite Montagne du Jura.

Chalvin L. 2017. Caractérisation de la relation entre les structures bocagères et l'avifaune du site Natura 2000 Petite Montagne du Jura. Rapport de stage de Master II. Université d'Aix-Marseille – Promotion EEGB 2016/2017

❖ Préconisations de gestion :

Maintien

- L'emprise et la hauteur de la haie arbustive peut être contenue par un entretien régulier.

Modalités de gestion :

Renouvellement du taillis d'arbustes :

- ➔ Recépage par tronçon tous les 10-15 ans ([fiche 2](#))

Entretien courant sans valorisation de biomasse :

- ➔ Taille latérale tous les 2-3 ans ([fiche 1](#))

Evolution

- Ce type de haie évolue naturellement vers un taillis sous futaie. Son évolution peut être accompagnée, notamment pour diversifier la structure de la haie en fonction des objectifs paysagers/de valorisation recherchés.

Modalités de gestion :

Favoriser le développement d'arbres en haut-jet ou en cépée :

- ➔ Identifier les jeunes arbres et aider leur développement par une taille de formation ([fiche 5](#))



Petite Montagne



Revermont



Revermont



Finage



Bresse



Plaines & Vallées du Doubs,...